

Patient Information Leaflet

What is in this leaflet

1. What Lexotan is used for
2. How Lexotan works
3. Before you take Lexotan
4. How to take Lexotan
5. While you are using Lexotan
6. Side effects
7. After using Lexotan
8. Product Description
9. Manufacturer

1. What Lexotan is used for

Lexotan contains the active ingredient bromazepam.

Lexotan is used to treat the following:

- *Emotional disturbances.*
Acute tension and anxiety states. Difficulties in interpersonal contact. Agitation, insomnia. Anxious, agitated depressive reactions.
- *Functional disturbances in the heart and lung systems* (pseudoangina pectoris, precordial anxiety, tachycardia, emotiogenic hypertension, dyspnea, hyperventilation)
- *In the gastrointestinal system* (irritable bowel syndrome, epigastric pain, spasm, bloating diarrhea, etc.)
- *In the genitourinary system* (frequency, irritable bladder; dysmenorrhea).
- *Psychosomatic disorders.*
Headache or skin problems caused by mental disturbances. Asthma. Gastric and duodenal ulcer, ulcerative colitis
- *Emotional reactions to chronic organic disease.*

Your doctor, however, may have prescribed Lexotan for another purpose.

Ask your doctor if you have any questions why Lexotan has been prescribed for you.

This medicine may be addictive.

This medicine is available only with a doctor's prescription.

2. How Lexotan works

Lexotan belongs to a group of medicines called benzodiazepines. They are thought to work by their action on brain chemicals.

3. Before you take Lexotan

When you must not take it

1. **You have had an allergic reaction to Lexotan, other benzodiazepines or any ingredients listed at the end of this leaflet.**
Some of the symptoms of an allergic reaction may include:
 - Shortness of breath
 - Wheezing or difficulty breathing
 - Swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body
 - Rash, itching or hives on the skin
2. **You have severe and chronic lung disease**
3. **You have severe liver disease.**
4. **You suffer from sleep apnoea (temporary stops in breathing during sleep)**
5. **The expiry date (EXP) printed on the pack has passed.**

If you take this medicine after the expiry date has passed, it may not work as well.
Do not give Lexotan to children.

If you are not sure if you should be taking Lexotan, talk to your doctor.

Before you start to take it

Inform your doctor if:

1. **You are pregnant or plan to become pregnant**
Lexotan is not recommended for use in pregnant women. Your doctor will discuss the risks and benefits of using it if you are pregnant or plan to become pregnant.
2. **You are breastfeeding or plan to breastfeed**
Lexotan passes into breast milk and therefore there is a possibility that the breast-fed baby may be affected. Lexotan is not recommended for use while breast-feeding.
3. **You have any other health problems including:**
 - Liver, kidney or lung disease
 - You suffer from depression, psychosis or schizophrenia
4. **You drink alcohol regularly**
Alcohol may increase the effects of Lexotan
5. **You are lactose intolerant**
6. **You are allergic to any other medicines, foods, dyes or preservatives.**

If you have not told your doctor about any of the above, tell them before you start taking Lexotan.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medicines including any that you have bought without

LEXOTAN[®]

contains the active ingredient bromazepam



a prescription from a pharmacy, supermarket or health food shop. Some medicines may interfere with Lexotan. These medicines include:

- other sleeping tablets, sedatives or tranquillisers
- other medicines for anxiety
- medicines used to treat certain mental and emotional conditions
- medicines for depression
- medicines to control fits (epilepsy)
- some medicines used to treat allergies and colds
- pain relievers
- muscle relaxants
- anaesthetics
- some medicines used to treat bacterial infections
- some medicines used to treat HIV infection
- some medicines used to treat heart conditions or high blood pressure
- cimetidine – a medicine used to treat ulcers

These medicines may be affected by Lexotan or may affect how well Lexotan works. You may need to use different amounts of your medicine, or you may need to take different medicines. Your doctor will advise you.

Your doctor or pharmacist has more information on medicines to be careful with or avoid while taking Lexotan.

If you have not told your doctor about any of the above, tell them before you start taking Lexotan.

Ask your doctor or pharmacist if you are not sure about this list of medicines.

4. How to take Lexotan

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully.

They may differ from the information contained in this leaflet.

If you do not understand the instructions on the box, ask your doctor or pharmacist for help.

How much to take

Take Lexotan exactly as your doctor has prescribed.

Your doctor will tell you how many Lexotan tablets to take each day.

The dose varies from person to person depending on age and the condition being treated. The average dosing for outpatient therapy is 1.5-3 mg up to three times daily.

Severe cases, especially in hospital may need 6-12 mg two or three times daily.

Elderly patients may need to take less.

How to take it

Swallow the tablets whole with a glass of water.

When to take it

Take the tablets as directed by your doctor. It may be taken with or without food.

How long to take it

Do not use Lexotan for longer than your doctor says.

Usually Lexotan should not be used more than 8-12 weeks, including a tapering off process. Continuous long-term use is not recommended unless advised by your doctor.

The use of benzodiazepines may lead to dependence on the medicine.

If you forget to take it

If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed

and take your next dose when you are meant to. Otherwise, take it as soon as you remember and then go back to taking it as you would normally.

Do not try to make up for the dose that you missed by taking more than one dose at a time. If you are not sure what to do, ask your doctor or pharmacist.

If you have trouble remembering your dose, ask your pharmacist for some hints.

In case of an overdose

You may need urgent medical attention. Contact your doctor or visit the nearest Accident & Emergency Department immediately (bring along the medication, carton and this leaflet if possible).

If you take too much Lexotan you may feel drowsy, confused, tired, dizzy, have difficulty breathing, feel weak or become unconscious.

If you are not sure what to do, contact your doctor or pharmacist.

5. While you are using Lexotan

Things you must do

Tell all doctors, dentists and pharmacists who are treating you that you are taking Lexotan.

Do not take any other medicines whether they require a prescription or not without first telling your doctor.

Tell your doctor if you become pregnant while taking Lexotan.

Tell your doctor if, for any reason, you have not taken your medicine exactly as prescribed.

LEXOTAN[®]

contains the active ingredient bromazepam



Otherwise, your doctor may think that it was not effective and change your treatment unnecessarily.

Tell your doctor if you feel the tablets are not helping your condition.

Be sure to keep all of your appointments with your doctor so that your progress can be checked.

Things you must not do

Do not drive or operate machinery until you know how Lexotan affects you.

Lexotan may cause drowsiness or dizziness in some people and therefore may affect alertness.

Make sure you know how you react to Lexotan before you drive a car, operate machinery, or do anything else that could be dangerous if you are drowsy, dizzy or not alert.

Even if you take Lexotan at night, you may still be drowsy or dizzy the next day.

Do not take Lexotan for a longer time than your doctor has prescribed.

Lexotan should be taken for short periods only, unless advised otherwise by your doctor.

Do not change your dose without first checking with your doctor.

Do not stop taking Lexotan or lower the dose, without first checking with your doctor.

Stopping this medicine suddenly may cause some unwanted effects. Your doctor will explain how you should slowly reduce your dose of Lexotan before you can stop taking it completely.

Do not give Lexotan to anyone else even if they have the same condition as you.

Do not use Lexotan to treat other complaints unless your doctor says so.

Things to be careful of

Be careful when drinking alcohol while taking Lexotan.

Combining Lexotan and alcohol may make you more sleepy, dizzy or lightheaded.

Your doctor may suggest that you avoid alcohol or reduce the amount of alcohol you drink while you are taking Lexotan.

Be careful if you are elderly, unwell or taking other medicines.

Some people may experience side effects such as drowsiness, confusion, dizziness and unsteadiness, which may increase the risk of a fall.

6. Side effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking Lexotan.

Lexotan helps most people with anxiety but it may have unwanted side effects in a few people. All medicines can have side effects. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical treatment if you get some of the side effects.

Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

Tell your doctor if you notice any of the following and they worry you:

- Drowsiness, tiredness
- Dizziness
- Headach
- Unpleasant dreams

- Muscle weakness

These are the more common side effects of Lexotan.

Tell your doctor as soon as possible if you notice any of the following and they worry you:

- Blurred vision
- Rash
- Loss of memory, inattentiveness, confusion, lack of concentration.

Tell your doctor immediately if you notice any of the following:

- Sudden anxiety or excitement
- Seeing, feeling or hearing things that are not there
- Nightmares

These are serious side effects and you may need medical attention.

Tell your doctor immediately, or go to Accident and Emergency at your nearest hospital, if you notice any of the following:

- Shortness of breath or difficulty in breathing.

These are serious side effects. You may need urgent medical attention. Serious side effects are rare.

This is not a complete list of all possible side effects. Others may occur in some people and there may be some effects which are not yet known.

Tell your doctor if you notice anything else that is making you feel unwell, even if it is not on this list.

Ask your doctor or pharmacist if you don't understand anything in this list.

Do not be alarmed by this list of possible side effects.

You may not experience any of them.

LEXOTAN[®]

contains the active ingredient bromazepam



7. After using Lexotan

Storage

Keep your tablets in the blister pack until it is time to take them.

If you take the tablets out of the blister pack they may not keep well.

Keep Lexotan in a cool dry place where the temperature stays below 30°C.

Disposal

Medicinal products should not be poured down the drain or thrown into household waste. Ask your pharmacist how to dispose of packaging and medicinal products you do not need. This will help protect the environment..

8. Product Description

What Lexotan looks like

Ingredients

Lexotan 1.5 mg tablets are slightly yellowish, cylindrical, biplane tablets marked with ROCHE/1.5 on one side and a simple break mark on the other side.

Ingredients

Active ingredient- bromazepam

Each 1.5 mg tablet contains 1.5 mg bromazepam

Inactive ingredients

- Lactose
- Microcrystalline cellulose
- Talc
- Magnesium stearate

Lexotan 1.5 mg tablets come in packs of 100.

Malaysia Registration Number (MAL):

Lexotan Roche Tablet 1.5 mg
(MAL19861302A)

9. Manufacturer

Made for F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland by Roche S.p.A Milan, production site Segrate Italy

Marketing Authorisation

Holder

Roche (M) Sdn. Bhd.
The Intermark,
348, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur

Date of Revision

12 November 2012
(MYPILLexotan0512/CDS5.0)

Risalah Maklumat Pesakit

Kandungan risalah ini

1. Kegunaan Lexotan
2. Cara Lexotan berfungsi
3. Sebelum anda mengambil Lexotan
4. Cara pengambilan Lexotan
5. Semasa anda menggunakan Lexotan
6. Kesan sampingan
7. Selepas menggunakan Lexotan
8. Keterangan Produk
9. Pengilang

1. Kegunaan Lexotan

Lexotan mengandungi bahan aktif bromazepam.

Lexotan digunakan untuk merawat yang berikut:

- *Gangguan emosi.* Keadaan tekanan dan kebimbangan akut. Kesukaran dalam hubungan interpersonal (hubungan sesama manusia). Agitasi, insomnia. Kebimbangan, tindak balas kemurungan beragitasi.
- *Gangguan fungsi sistem jantung and pernafasan* (pseudoangina pectoris, kebimbangan prekordial, takikardia, tekanan darah tinggi emotiogenic, dispnea, hiperventilasi)
- *Dalam sistem perut dan usus* (sindrom usus renga, kesakitan epigastrik, spasme, cirit-birit kembung, dll.)
- *Dalam sistem salur kencing* (kekerapan kencing, pundi renga; sakit semasa haid).
- *Gangguan mental yang memburukkan masalah fizikal.* Sakit kepala atau masalah kulit akibat gangguan mental. Asma. Gastrik dan ulser duodenum, kolitis ulseratif

- *Tindak balas emosi terhadap penyakit organik kronik.*

Walau bagaimanapun, doktor anda mungkin telah menentukan pengambilan Lexotan untuk tujuan lain.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang mengapa Lexotan telah ditentukan pengambilannya untuk anda.

Ubat ini mungkin boleh menyebabkan ketagihan.

Ubat ini hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor.

2. Cara Lexotan berfungsi

Lexotan tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil "benzodiazepine" (benzodiazepine). Ia dianggap berkesan melalui tindakannya pada bahan kimia otak.

3. Sebelum anda mengambil Lexotan

Waktu anda dilarang mengambilnya

1. **Anda mempunyai tindak balas alahan terhadap Lexotan, mana-mana ubat benzodiazepine lain, atau mana-mana bahan yang disenaraikan di penghujung risalah ini.**

Sebahagian daripada gejala tindak balas alahan mungkin merangkumi:

- Sesak nafas
- Berdehit atau kesukaran bernafas
- Bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan lain
- Ruam, kegatalan atau geligata pada kulit

2. **Anda menghidap penyakit paru-paru yang teruk dan kronik**
3. **Anda menghidap penyakit hati yang teruk.**
4. **Anda menghidap sindrom apnea tidur (pernafasan berhenti sementara semasa tidur)**
5. **Tarikh luput (EXP) yang tertera pada pek telah dilepasi.**

Jika anda mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang ditetapkan, ia mungkin tidak berhasil seperti yang diharapkan.

Jangan berikan Lexotan kepada kanak-kanak.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil Lexotan, berbincanglah dengan doktor anda.

Sebelum anda mula mengambilnya

Maklumkan kepada doktor anda jika:

1. **Anda hamil atau merancang untuk hamil**
Lexotan tidak disarankan untuk penggunaan bagi wanita hamil. Doktor anda akan menerangkan risiko dan manfaat menggunakannya jika anda hamil atau merancang untuk hamil.
2. **Anda menyusui badan atau merancang untuk menyusui badan**
Lexotan meresapi susu badan dan oleh itu terdapat kemungkinan boleh menjejaskan bayi yang diberikan susu badan. Lexotan tidak disarankan untuk penggunaan semasa menyusui badan.

3. Anda mempunyai sebarang masalah kesihatan yang lain merangkumi:

- Penyakit hati, buah pinggang atau paru-paru
- Anda mengalami kemurungan, psikosis atau skizofrenia

4. Anda minum alkohol dengan kerap
Alkohol boleh meningkatkan kesan Lexotan

5. Anda tidak tahan laktosa

6. Anda alah kepada ubat-ubat lain, makanan, pewarna atau pengawet.

Jika anda belum memaklumkan doktor anda tentang mana-mana yang di atas, maklukkannya sebelum anda mula mengambil Lexotan.

Mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor anda jika anda sedang mengambil mana-mana ubat lain termasuk mana-mana yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh mengganggu dengan Lexotan. Ubat-ubat ini merangkumi:

- pil tidur, sedatif atau ubat penenang lain
- ubat lain untuk kebimbangan
- ubat yang digunakan untuk merawat keadaan mental dan emosi tertentu
- ubat untuk kemurungan
- ubat untuk mengawal sawan (epilepsi)
- sesetengah ubat yang digunakan untuk merawat alahan dan selesema
- pelega kesakitan
- pengendur otot
- bius

- sesetengah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria
- sesetengah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan HIV
- sesetengah ubat yang digunakan untuk merawat keadaan jantung atau tekanan darah tinggi
- Cimetidine – sejenis ubat yang digunakan untuk merawat ulser

Ubat-ubat ini boleh dipengaruhi oleh Lexotan atau boleh mempengaruhi keberkesanan Lexotan. Anda mungkin perlu menggunakan jumlah ubat yang berbeza, atau mungkin perlu mengambil ubat yang berbeza. Doktor anda akan menasihati anda.

Doktor atau ahli farmasi anda memiliki lebih banyak maklumat tentang ubat yang perlu diberi perhatian atau elakkan semasa mengambil Lexotan.

Jika anda belum memaklumkan doktor anda tentang mana-mana yang di atas, maklukkannya sebelum anda mula mengambil Lexotan.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti tentang senarai ubat-ubatan ini.

4. Cara pengambilan Lexotan

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan berhati-hati.

Arahan tersebut mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

Jumlah pengambilan

Ambil Lexotan seperti yang ditentukan oleh doktor anda.

Doktor anda akan memaklumkan anda jumlah Lexotan yang perlu diambil pada setiap hari.

Dos berbeza daripada orang ke orang bergantung pada umur dan keadaan semasa rawatan.

Dos purata bagi terapi pesakit luar adalah 1.5-3 mg yang diberikan sehingga tiga kali sehari.

Kes-kes teruk, terutamanya di hospital, mungkin memerlukan 6-12 mg dua atau tiga kali sehari. Pesakit tua mungkin perlu mengurangkan pengambilannya.

Cara mengambilnya

Telan ubat biji sepenuhnya dengan segelas air.

Waktu mengambilnya

Ambil ubat biji seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Ia boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

Jangka waktu pengambilannya

Jangan gunakan Lexotan lebih lama daripada yang dinasihatkan oleh doktor anda.

Lazimnya Lexotan tidak harus digunakan untuk lebih daripada 8-12 minggu, termasuk proses pengurangan dos secara perlahan. Penggunaan jangka panjang secara berterusan adalah tidak disarankan melainkan atas nasihat doktor anda.

Penggunaan benzodiazepine boleh mengakibatkan pergantungan pada ubat ini.

Jika anda terlupa untuk mengambilnya

Jika ia menghampiri waktu dos anda yang berikutnya, jangan ambil dos yang tertinggal dan ambil dos anda yang berikutnya pada masa yang sesuai. Jika

tidak, ambilnya sebaik sahaja anda ingat dan kemudian kembali mengambilnya seperti yang biasa anda lakukan.

Jangan cuba menggantikan dos yang anda tertinggal dengan mengambil lebih daripada satu dos secara serentak.

Jika anda tidak pasti apa yang harus dibuat, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda menghadapi masalah untuk mengingat dos anda, tanya ahli farmasi anda untuk beberapa petunjuk.

Sekiranya dos berlebihan

Anda mungkin perlu rawatan perubatan segera. Hubungi doktor atau pergi ke Jabatan Kecemasan dengan segera (bawa sekali baki ubat, kotak ubat, atau risalah ini jika boleh)

Jika anda mengambil terlalu banyak Lexotan, anda mungkin rasa mengantuk, keliru, penat, pening, kesukaran bernafas, lemah atau menjadi tidak sedar.

Jika anda tidak pasti apa yang harus dibuat, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

5. Sewaktu anda menggunakan Lexotan

Perkara yang mesti anda lakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda yang anda sedang mengambil Lexotan.

Jangan ambil mana-mana ubat lain sama ada ia memerlukan preskripsi atau tidak tanpa memberitahu doktor anda terlebih dahulu.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda hamil semasa mengambil Lexotan.

Maklumkan kepada doktor anda jika, atas apa jua sebab, anda tidak mengambil ubat anda betul-betul seperti yang ditentukan.

Jika tidak, doktor anda mungkin merasakan yang ianya tidak berkesan dan mengubah rawatan anda.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda rasa Lexotan tidak membantu keadaan anda.

Pastikan anda mematuhi semua temujanji anda dengan doktor anda supaya kemajuan anda boleh disemak.

Perkara yang tidak boleh anda lakukan

Jangan memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui bagaimana Lexotan mempengaruhi anda.

Lexotan boleh menyebabkan rasa mengantuk, atau kepeningan ke atas sesetengah orang dan oleh itu boleh menjejaskan kewaspadaan.

Pastikan anda tahu cara anda bertindak balas dengan Lexotan sebelum anda memandu kereta atau mengendalikan jentera, atau melakukan sesuatu yang lain yang boleh mendatangkan bahaya jika anda mengantuk, pening atau tidak berwaspada.

Walaupun anda mengambil Lexotan pada waktu malam, anda mungkin rasa mengantuk atau pening keesokan harinya.

Jangan mengambil Lexotan untuk tempoh waktu yang lebih panjang daripada yang ditentukan oleh doktor anda.

Lexotan sepatutnya diambil untuk jangka waktu pendek sahaja, melainkan dinasihatkan sebaliknya oleh doktor anda.

Jangan mengubah dos anda tanpa menyemak terlebih dahulu dengan doktor anda.

Jangan hentikan pengambilan Lexotan atau mengurangkan dos, tanpa menyemak terlebih dahulu dengan doktor anda.

Menghentikan pengambilan ubat ini secara tiba-tiba boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak diingini. Doktor anda akan menerangkan kepada anda cara mengurangkan dos Lexotan secara perlahan-lahan sebelum anda boleh menghentikan terus pengambilannya.

Jangan berikan Lexotan kepada orang lain meskipun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan gunakan Lexotan untuk merawat aduan lain melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Perkara yang perlu diberikan perhatian

Berhati-hati apabila minum alkohol semasa mengambil Lexotan.

Campuran Lexotan dan alkohol boleh membuat anda lebih mengantuk, sakit kepala atau pening-pening lalat.

Doktor anda mungkin menyarankan anda untuk mengelakkan minum alkohol atau mengurangkan jumlah alkohol yang anda minum semasa anda mengambil Lexotan.

Berhati-hati jika anda sudah berumur, tidak sihat atau sedang mengambil ubat-ubat lain.

Sesetengah orang mungkin mengalami kesan sampingan seperti mengantuk, keliru, kepening dan kegoyahan, yang boleh meningkatkan risiko terjatuh.

LEXOTAN[®]

mengandungi bahan aktif bromazepam



6. Kesan sampingan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda berasa tidak sihat semasa anda mengambil Lexotan.

Lexotan membantu kebanyakan orang yang mengalami masalah keseimbangan namun ia boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak dingini pada segelintir orang. Semua ubat boleh mendatangkan kesan sampingan.

Kadang kala ianya serius, namun lazimnya ia tidak serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mengalami sebahagian daripada kesan sampingan yang dinyatakan.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda perasan mana-mana yang berikut dan ianya merisaukan anda:

- Mengantuk, kepenatan
- Kepeningan
- Sakit kepala
- Mimpi yang tidak menyenangkan
- Kelemahan otot

Perkara di atas merupakan kesan sampingan yang lebih biasa bagi Lexotan.

Maklumkan kepada doktor anda secepat mungkin jika anda perasan mana-mana yang berikut dan ianya merisaukan anda:

- Penglihatan kabur
- Ruam
- Hilang ingatan, kurang memberi perhatian, keliru, kurang penumpuan.

Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda

perasan mana-mana yang berikut:

- Kebimbangan atau eksitasi/ rasa teruja secara tiba-tiba
- Melihat, rasa atau dengar perkara yang tidak wujud
- Mimpi buruk

Perkara di atas merupakan kesan sampingan yang serius dan anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Maklumkan kepada doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang berhampiran jika anda mengalami:

- Sesak nafas atau kesukaran bernafas.

Perkara di atas merupakan kesan sampingan yang serius. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Kesan sampingan serius adalah jarang berlaku.

Ini bukanlah senarai kesan sampingan yang lengkap. Kesan sampingan lain mungkin berlaku pada sesetengah orang dan mungkin terdapat kesan sampingan yang masih belum diketahui.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda perasan apa-apa perkara lain yang membuatkan anda berasa tidak sihat, walaupun ia tiada dalam senarai ini.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak memahami apa-apa maklumat dalam senarai ini.

Jangan berasa cemas dengan senarai kesan sampingan berkemungkinan ini.

Anda mungkin tidak akan mengalami sama sekali kesan sampingan yang dinyatakan.

7. Selepas menggunakan Lexotan

Penyimpanan

Simpan ubat biji anda dalam pek lepuh sehingga sampai waktu untuk mengambilnya.

Jika anda mengambil ubat keluar dari pek lepuh untuk jangka masa yang panjang, ia mungkin rosak atau kurang berkesan.

Simpan Lexotan di tempat kering dan dingin di bawah suhu 30°C.

Pelupusan

Jangan buang ubat melalui air kumbahan atau sampah-sarap isi rumah. Sila tanya ahli Farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang tidak diperlukan. Tindakan ini akan membantu melindungi alam sekitar.

8. Keterangan Produk

Rupa dan Bahan-Bahan Lexotan

Ubat biji Lexotan 1.5 mg berbentuk silinder, dwisatuh dan berwarna sedikit kekuningan, ditandakan dengan ROCHE/1.5 pada satu bahagian dan tanda putus ringkas pada satu bahagian yang lain.

Bahan-bahan

Bahan aktif - bromazepam

Setiap ubat biji 1.5 mg mengandungi 1.5 mg bromazepam

Bahan-bahan tidak aktif

- Laktosa
- Selulosa mikrokristal
- Talkum
- Magnesium stearat

LEXOTAN[®]

mengandungi bahan aktif bromazepam



Ubat biji Lexotan 1.5 mg
dibungkus dalam pek yang
mengandungi 100 biji.

**Nombor Pendaftaran Malaysia
(MAL):**

Lexotan Roche Tablet 1.5 mg
(MAL19861302A)

9. Pengilang

Dibuat untuk F. Hoffmann-La
Roche Ltd., Basel, Switzerland
oleh Roche S.p.A Milan, tapak
pengeluaran Segrate Itali

**Pemegang Kebenaran
Pemasaran**

Roche (M) Sdn. Bhd.
The Intermark,
348, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur

Tarikh Semakan

12 November 2012
(MYPILLexotan0512/CDS5.0)