

Acyclovir 800 STADA

Acyclovir 800 mg

What is in this leaflet

What Acyclovir 800 STADA is used for

How Acyclovir 800 STADA works

Before you take Acyclovir 800 STADA

How to take Acyclovir 800 STADA

While you are using Acyclovir 800

STADA

Side effects

After using Acyclovir 800 STADA

Product description

What Acyclovir 800 STADA is used for

Acyclovir 800 STADA is a medicine for the treatment of viral infections (antiviral agent). Acyclovir is used for Shingles (herpes zoster).

How Acyclovir 800 STADA works

Acyclovir is an antiviral medicine, which acts on infected cells by stopping the virus growing.

Before you use Acyclovir 800 STADA

When you must not take it

If you are allergic (hypersensitive) to medications containing acyclovir or valacyclovir, or any of the other ingredients of Acyclovir 800 STADA.

Before you start to take it

Please discuss with your doctor or pharmacist before taking Acyclovir 800 Stada.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription. Probenecid (uricosuric drug for gout) reduces acyclovir excretion via the kidneys, which may increase acyclovir persistence in the body.

How to take Acyclovir 800 STADA

How much to take

The instructions given below apply unless your doctor has prescribed Acyclovir 800 Stada otherwise for you.

Adults:

Shingles (herpes zoster): Take 1 tablet (800mg) of acyclovir 5 times daily every 4 hours during the day.

Patients with kidney function impairment, which is particularly prevalent in elderly

patients, may need a lower acyclovir dose than indicated above. If you should have kidney problems, your doctor will adjust your dosage to reflect your kidney function.

When to take it

Swallow the tablets whole with a sufficient amount of liquid (eg. A glass of water) after meals. An adequate fluid intake must be ensured during Acyclovir 800 Stada therapy, especially in patients with impaired kidney function. For best response, Acyclovir 800 Stada therapy should be started as early as possible, ie. As soon as you notice the first signs on your skin.

How long to take it

Your doctor will determine for how long you should continue Acyclovir 800 Stada therapy. The duration of therapy of herpes zoster is 7 days.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Continue your treatment as prescribed. If you have forgotten several doses, or if you have not been taking enough Acyclovir 800 Stada, please consult your doctor.

If you take too much (overdose)

Intoxication is unlikely after an Acyclovir 800 Stada overdose. A single dose of 5g of acyclovir produced no signs or symptoms of intoxication. However, no data are available for higher single (over) doses. If you suspect an overdose, should experience pronounced side effects or are in doubt, be sure to discuss with your doctor any concerns you may have. Acyclovir is effectively eliminated by haemodialysis.

While you are using Acyclovir 800 STADA

Things you must do

Always take Acyclovir 800 Stada exactly as your doctor or pharmacist has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Things you must not do

Please do not:

1) Take any other medicines on your own.

2) Take probenecid concurrently.

Things to be careful of

Acyclovir has been detected in breast milk following administration of acyclovir products. Breast-feeding is therefore discouraged while taking Acyclovir 800 Stada.

Side effects

Like all medicines, Acyclovir tablets can cause side effects, although not everybody gets them.

Common side effects are:

- Dizziness
- Skin rashes
- Nausea
- Diarrhea
- Abdominal pain

Should you experience any adverse effects not described in this Insert, please be sure to inform your doctor or pharmacist.

After using Acyclovir 800 STADA

Storage

Keep out of the reach and sight of children.

Store below 25°C.

Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product description

What it looks like?

Acyclovir 800 STADA is oblong, white with breaking notch on both sides, imprint with VS 3.

It is available in pack of 35's.

Ingredients

The active substance is acyclovir.

The other ingredients are

Colloidal anhydrous silica, Copolyvidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycollate
MAL No. MAL19984317A

Manufacturer

STADAPHARM GmbH

Date of revision

14 August 2012

Stadastrasse 2-18, D-61118, Bad Vibel,
West Germany.

Marketing Authorisation Holder

Stadpharm Sdn Bhd
B-05-05, 5th Floor, 3-Two Square,
Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya,
Selangor.

Acyclovir 800 STADA

Acyclovir 800 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Apakah kegunaan Acyclovir 800 STADA
Bagaimana Acyclovir 800 STADA berfungsi

Sebelum mengambil Acyclovir 800 STADA

Cara menggunakan Acyclovir 800 STADA

Semasa menggunakan Acyclovir 800 STADA

Kesan-kesan sampingan

Cara penyimpanan dan pelupusan

Acyclovir 800 STADA

Maklumat Lanjut

Apakah kegunaan Acyclovir 800 STADA

Acyclovir 800 STADA adalah ubat untuk rawatan jangkitan virus (agen antivirus). Acyclovir digunakan untuk jangkitan virus Shingles (herpes zoster).

Bagaimana Acyclovir 800 STADA berfungsi

Acyclovir adalah ubat antiviral yang bertindak ke atas sel-sel yang dijangkiti dengan mencegah pertumbuhan virus.

Sebelum mengambil Acyclovir 800 STADA

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alergic (hipersensitif) terhadap ubat yang mengandungi acyclovir atau valacyclovir, atau mana-mana ramuan Acyclovir 800 STADA yang lain.

Sebelum anda mula mengambil

Sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Acyclovir 800 Stada.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Probenecid (ubat urikosurik untuk gout) mengurangkan perkumuhan acyclovir melalui ginjal, yang boleh meningkatkan pengekalan acyclovir dalam badan.

Cara menggunakan Acyclovir 800 STADA

Berapa banyak harus diambil

Arahan yang diberikan di bawah diguna pakai melainkan jika doktor telah mempreskripsikan Acyclovir 800 Stada sebaliknya untuk anda.

Dewasa:

Shingles (herpes zoster):

Ambil 1 tablet (800mg) 5 kali sehari setiap 4 jam.

Pesakit dengan fungsi ginjal terjejas, khususnya yang wujud di kalangan pesakit warga tua, akan memerlukan dos acyclovir yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di atas. Jika anda mempunyai masalah ginjal, doktor akan menyesuaikan dosis untuk mencerminkan fungsi ginjal anda.

Bila perlu diambil

Telan tablet seluruhnya dengan cecair yang cukup (contohnya segelas air) selepas makan. Pengambilan cecair yang mencukupi perlu dipastikan semasa terapi Acyclovir 800 Stada, terutamanya bagi pesakit dengan fungsi ginjal yang terjejas. Untuk respons terbaik, terapi Acyclovir 800 Stada perlu dimulakan seawal yang mungkin, iaitu sebaik sahaja tanda atau simptom pertama jangkitan muncul. Khususnya untuk jangkitan virus herpes simplex yang berulang, Acyclovir 800 Stada perlu dimulakan pada prodromes pertama(contohnya gatal, lecuran/ketidakselesaian, vesikel awal).

Berapa lama perlu diambil

Doktor akan menentukan berapa lama anda perlu meneruskan terapi Acyclovir 800 Stada. Dalam jangkitan virus herpes simplex, terapi Acyclovir 800 Stada biasanya akan diteruskan selama lima hari, tetapi keadaan klinikal pesakit boleh menyebabkan rawatan yang lebih panjang.

Jika terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Teruskan rawatan anda sebagaimana yang dipreskripsikan. Jika anda telah lupa beberapa dos, atau jika anda tidak mengambil Acyclovir 800 Stada yang cukup, sila rujuk kepada doktor.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Intoksikasi tidak mungkin selepas dos berlebihan Acyclovir 800 Stada. Dos tunggal 5g acyclovir tidak menghasilkan tanda atau simptom intoksikasi. Namun, tiada data tersedia untuk dos tunggal yang lebih tinggi. Jika anda mengesyaki dos berlebihan, mengalami kesan sampingan yang ketara atau dalam keraguan, pastikan anda bincang dengan doktor tentang apa-apa kebimbangan yang anda anda. Acyclovir dihapuskan dengan berkesan oleh hemodialisis.

Semasa menggunakan Acyclovir 800 STADA

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mengambil Acyclovir 800 Stada tepat seperti yang diberitahu doktor atau ahli farmasi. Anda harus semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Sila tidak:

- 1) Ambil apa-apa ubat lain dengan sendiri.
- 2) Ambil probenecid serentak.

Perkara yang perlu diambil perhatian

Acyclovir telah dikesan dalam susu ibu berikutan pemberian produk acyclovir. Oleh itu, menyusu adalah tidak digalakkan semasa mengambil Acyclovir 800 Stada.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, tablet Acyclovir boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Kesan-kesan sampingan yang biasa adalah:

- Pening kepala
- Ruam kulit
- Rasa loya
- Cirit-birit
- Sakit perut

Sekiranya anda mengalami sebarang kesan buruk yang tidak diterangkan dalam Sisipan ini, sila pastikan anda maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi.

Cara penyimpanan dan pelupusan Acyclovir 800 STADA

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak.
Simpan di bawah 25°C.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Tarikh kemaskini RiMUP

14 Ogos 2012

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Acyclovir 800 STADA ialah tablet bulat, putih, dwicembung, tertera VS 3. Ia tersedia dalam pek sebanyak 35.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif ialah acyclovir.
Ramuan lain ialah

Colloidal anhydrous silica, Copolyvidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Sodium StarchGlycollate
Nombor MAL: MAL19984317A

Pengilang

STADAPHARM GmbH
Stadastrasse 2-18, D-61118, Bad Vibel,
West Germany.

Pemegang Autorisasi Pemasaran

Stadpharm Sdn. Bhd.
B05-05, 5th Floor, 3-Two Square,
Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya,
Selangor.

