

Acyclovir 200 STADA

Acyclovir 200 mg

What is in this leaflet

What Acyclovir 200 STADA is used for

How Acyclovir 200 STADA works

Before you take Acyclovir 200 STADA

How to take Acyclovir 200 STADA

While you are using Acyclovir 200 STADA

Side effects

After using Acyclovir 200 STADA

Product description

What Acyclovir 200 STADA is used for

Acyclovir 200 STADA is a medicine for the treatment of viral infections (antiviral agent). Acyclovir is used for Herpes simplex virus infections, genital herpes of the skin and mucous in particular (primary and frequently recurring genital herpes). Recurrence prevention is indicated for adults with very severe forms of very frequently recurring genital herpes simplex virus infection.

How Acyclovir 200 STADA works

Acyclovir is an antiviral medicine, which acts on infected cells by stopping the virus growing.

Before you use Acyclovir 200 STADA

When you must not take it

If you are allergic (hypersensitive) to medications containing acyclovir or valacyclovir, or any of the other ingredients of Acyclovir 200 STADA. If your kidney function is impaired or your urinary output is reduced to less than 100ml of urine per 24 hours, you should not use Acyclovir 200 STADA for prevention because no data are available on the use of Acyclovir 200 STADA in these conditions.

Acyclovir has been detected in breast milk following administration of acyclovir products. Breast-feeding is therefore discouraged while taking Acyclovir 200 Stada.

Before you start to take it

Please discuss with your doctor or pharmacist before taking Acyclovir 200 Stada.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Probenecid (uricosuric drug for gout) reduces acyclovir excretion via the kidneys, which may increase acyclovir persistence in the body.

How to take Acyclovir 200 STADA

How much to take

The instructions given below apply unless your doctor has prescribed Acyclovir 200 Stada otherwise for you.

Adults:

Herpes simplex virus infections:

Take 1 tablet (200mg of acyclovir) 5 times daily every 4 hours during the day. Prophylaxis of severe forms and very frequently recurring genital herpes simplex virus infections:

Immunocompetent patients take 1 tablet (200mg of acyclovir) 4 times daily every 6 hours.

Some patients may achieve effective prophylaxis with 1 tablet (200mg of acyclovir) 3 times daily every 8 hours or 1 tablet (200mg of acyclovir) twice daily every 12 hours.

Immunocompromised patients take a prophylactic dosage of 1 tablet (200mg of acyclovir) 4 times daily every 6 hours. Severely immunocompromised patients, for example following organ transplants, may need 2 tablets (400mg of acyclovir) 4 times daily every 6 hours.

Children:

For the treatment of herpes simplex virus infection, children over 2 years old receive the adult dosage and those under 2 half the adult dosage.

Patients with kidney function impairment, which is particularly prevalent in elderly patients, may need a lower acyclovir dose than indicated above. If you should have kidney problems, your doctor will adjust your dosage to reflect your kidney function.

When to take it

Swallow the tablets whole with a sufficient amount of liquid (eg. A glass of water) after meals. An adequate fluid

intake must be ensured during Acyclovir 200 Stada therapy, especially in patients with impaired kidney function.

For best response, Acyclovir 200 Stada therapy should be started as early as possible, ie. As soon as the first signs or symptoms of infection appear. Especially with recurrent herpes simplex virus infection, Acyclovir 200 Stada should be started on the first prodromes (eg itching, burning/discomfort, early vesicles).

How long to take it

Your doctor will determine for how long you should continue Acyclovir 200 Stada therapy. In herpes simplex virus infections, Acyclovir 200 Stada therapy will usually be continued for 5 days, but the patient's clinical conditions may call for longer treatment.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Continue your treatment as prescribed. If you have forgotten several doses, or if you have not been taking enough Acyclovir 200 Stada, please consult your doctor.

If you take too much (overdose)

Intoxication is unlikely after an Acyclovir 200 Stada overdose. A single dose of 5g of acyclovir produced no signs or symptoms of intoxication. However, no data are available for higher single (over) doses. If you suspect an overdose, should experience pronounced side effects or are in doubt, be sure to discuss with your doctor any concerns you may have. Acyclovir is effectively eliminated by haemodialysis.

While you are using Acyclovir 200 STADA

Things you must do

Always take Acyclovir 200 Stada exactly as your doctor or pharmacist has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Things you must not do

Please do not:

- 1) Take any other medicine on your own.
- 2) Take probenecid concurrently.

Things to be careful of

Acyclovir has been detected in breast milk following administration of acyclovir products. Breast-feeding is therefore discouraged while taking Acyclovir 200 Stada.

Side effects

Like all medicines, Acyclovir tablets can cause side effects, although not everybody gets them.

Common side effects are:

- Dizziness
- Skin rashes
- Nausea

Date of revision

14 August 2012

- Diarrhea
- Abdominal pain

Should you experience any adverse effects not described in this Insert, please be sure to inform your doctor or pharmacist.

After using Acyclovir 200 STADA

Storage

Keep out of the reach and sight of children.

Store below 25°C.

Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product description

What it looks like?

Acyclovir 200 STADA is round, white, biconvex tablet, imprint with VS 1. It is available in pack of 25's.

Ingredients

The active substance is acyclovir.

The other ingredients are

Colloidal anhydrous silica, Copolyvidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycollate

MAL No. MAL19983993A

Manufacturer

STADAPHARM GmbH

Stadastrasse 2-18, D-61118, Bad Vilbel, West Germany.

Marketing Authorisation Holder

Stadpharm Sdn Bhd

B-05-05, 5th Floor, 3-Two Square, Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya, Selangor.

Acyclovir 200 STADA

Acyclovir 200 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Apakah kegunaan Acyclovir 200 STADA
Bagaimana Acyclovir 200 STADA berfungsi

Sebelum mengambil Acyclovir 200 STADA

Cara menggunakan Acyclovir 200 STADA

Semasa menggunakan Acyclovir 200 STADA

Kesan-kesan sampingan

Cara penyimpanan dan pelupusan

Acyclovir 200 STADA

Maklumat Lanjut

Apakah kegunaan Acyclovir 200 STADA

Acyclovir 200 STADA adalah ubat untuk rawatan jangkitan virus (agen antivirus). Acyclovir digunakan untuk jangkitan virus Herpes simplex, herpes genital kulit dan mukus khususnya (herpes genital primer dan yang kerap berulang). Pencegahan pengulangan diperlukan untuk dewasa dengan bentuk jangkitan virus herpes simplex genital yang kerap berulang yang teruk.

Bagaimana Acyclovir 200 STADA berfungsi

Acyclovir adalah ubat antiviral yang bertindak ke atas sel-sel yang dijangkiti dengan mencegah pertumbuhan virus.

Sebelum mengambil Acyclovir 200 STADA

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alergic (hipersensitif) terhadap ubat yang mengandungi acyclovir atau valacyclovir, atau mana-mana ramuan Acyclovir 200STADA yang lain.

Jika fungsi ginjal anda terjejas atau keluaran urinari anda berkurangan kepada kurang daripada 100ml air kencing setiap 24 jam, anda tidak harus menggunakan Acyclovir 200 STADA untuk pencegahan kerana tiada data yang tersedia tentang penggunaan Acyclovir 200 STADA dalam keadaan ini.

Acyclovir telah dikesan dalam susu ibu berikutan pemberian produk acyclovir. Oleh itu, menyusu tidak digalakkan semasa mengambil Acyclovir 200 Stada.

Sebelum anda mula mengambil

Sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Acyclovir 200 Stada.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Probenecid (ubat urikosurik untuk gout) mengurangkan perkumuhan acyclovir melalui ginjal, yang boleh meningkatkan pengekalan acyclovir dalam badan.

Cara menggunakan Acyclovir 200 STADA

Berapa banyak harus diambil

Arahan yang diberikan di bawah diguna pakai melainkan jika doktor telah mempreskripsikan Acyclovir 200 Stada sebaliknya untuk anda.

Dewasa:

Jangkitan virus Herpes simplex:

Ambil 1 tablet (200mg of acyclovir) 5 kali sehari setiap 4 jam.

Profilaksis bentuk yang teruk dan jangkitan virus herpes simplex genital yang sangat kerap berulang:

Pesakit immunokompetant mengambil 1 tablet (200mg acyclovir) 4 kali sehari setiap 6 jam.

Sesetengah pesakit boleh mencapai profilaksis yang berkesan dengan 1 tablet (200mg acyclovir) 3 kali sehari setiap 8 jam atau 1 tablet (200mg acyclovir) dua kali sehari setiap 12 jam.

Pesakit immunokompromised mengambil dos profilaktik 1 tablet (200mg acyclovir) 4 kali sehari setiap 6 jam.

Pesakit immunokompromised yang teruk, contohnya berikutan pemindahan organ, akan memerlukan 2 tablet (400mg acyclovir) 4 kali sehari setiap 6 jam.

Kanak-kanak:

Untuk rawatan jangkitan virus herpes simplex, kanak-kanak lebih daripada 2 tahun menerima dos dewasa dan yang di bawah 2 tahun menerima separuh dos dewasa.

Pesakit dengan fungsi ginjal terjejas, khususnya yang wujud di kalangan pesakit warga tua, akan memerlukan dos acyclovir yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di atas. Jika anda mempunyai masalah ginjal, doktor akan menyesuaikan dos untuk mencerminkan fungsi ginjal anda.

Bila perlu diambil

Telan tablet seluruhnya dengan cecair yang cukup (contohnya segelas air) selepas makan. Pengambilan cecair yang mencukupi perlu dipastikan semasa terapi Acyclovir 200 Stada, terutamanya bagi pesakit dengan fungsi ginjal yang terjejas. Untuk respons terbaik, terapi Acyclovir 200 Stada perlu dimulakan seawal yang mungkin, iaitu sebaik sahaja tanda atau simptom pertama jangkitan muncul. Khususnya untuk jangkitan virus herpes simplex yang berulang, Acyclovir 200 Stada perlu dimulakan pada prodromes pertama(contohnya gatal, lecuran/ketidakelesaian, vesikel awal).

Berapa lama perlu diambil

Doktor akan menentukan berapa lama anda perlu meneruskan terapi Acyclovir 200 Stada. Dalam jangkitan virus herpes simplex, terapi Acyclovir 200 Stada biasanya akan diteruskan selama lima hari, tetapi keadaan klinikal pesakit boleh menyebabkan rawatan yang lebih panjang.

Jika terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Teruskan rawatan anda sebagaimana yang dipreskripsikan. Jika anda telah terlupa beberapa dos, atau jika anda tidak mengambil Acyclovir 200 Stada yang cukup, sila rujuk kepada doktor.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Intoksikasi tidak mungkin selepas dos berlebihan Acyclovir 200 Stada. Dos tunggal 5g acyclovir tidak menghasilkan tanda atau simptom intoksikasi. Namun, tiada data tersedia untuk dos tunggal yang lebih tinggi. Jika anda mengesyaki dos berlebihan, mengalami kesan sampingan yang ketara atau dalam keraguan, pastikan

anda bincang dengan doktor tentang apa-apa kebimbangan yang anda anda. Acyclovir dihapuskan dengan berkesan oleh hemodialisis.

Semasa menggunakan Acyclovir 200 STADA

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mengambil Acyclovir 200 Stada tepat seperti yang diberitahu doktor atau ahli farmasi. Anda harus semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Sila tidak:

- 3) Ambil apa-apa ubat lain dengan sendiri.
- 4) Ambil probenecid serentak.

Perkara yang perlu diambil perhatian

Acyclovir telah dikesan dalam susu ibu berikutan pemberian produk acyclovir. Oleh itu, menyusu adalah tidak

digalakkan semasa mengambil Acyclovir 200 Stada.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, tablet Acyclovir boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Kesan-kesan sampingan yang biasa adalah:

- Pening kepala
- Ruam kulit
- Rasa loya
- Cirit-birit
- Sakit perut

Sekiranya anda mengalami sebarang kesan buruk yang tidak diterangkan dalam Sisipan ini, sila pastikan anda maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi.

Cara penyimpanan dan pelupusan

Acyclovir 200 STADA

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan di bawah 25°C.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Acyclovir 200 STADA ialah tablet bulat, putih, dwicembung, tertera VS 1. Ia tersedia dalam pek sebanyak 25.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif ialah acyclovir.

Ramuan lain ialah

Colloidal anhydrous silica, Copolyvidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Sodium StarchGlycollate

Nombor MAL: MAL19983993A

Pengilang

STADAPHARM GmbH

Stadastrasse 2-18, D-61118, Bad Vibel, West Germany.

Tarikh kemaskini RiMUP

14 Ogos 2012

Pemegang Autorisasi Pemasaran

StadpharmSdnBhd

B-05-05, 5th Floor, 3-Two Square, Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya, Selangor.