

Allo 100 Tablet

Allo 300 Tablet

Allopurinol 100mg

Allopurinol 300mg

What is in this leaflet?

1. What Allo Tablet is used for
2. How Allo Tablet works
3. Before you use Allo Tablet
4. How to take Allo Tablet
5. While you are using Allo Tablet
6. Side effects
7. After using Allo Tablet

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or your pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

1. What Allo Tablet is used for

Allopurinol tablets are used in:

- the management of gout and other conditions associated with too much uric acid in the body, such as kidney disease, metabolic disorders, certain skin diseases, cancer and treatment with diuretic ("water tablets").
- certain types of kidney stones.

2. How Allo Tablet works

Allo Tablet contains the active substance allopurinol, which acts by inhibiting the enzyme that changes hypoxanthine to uric acids.

3. Before you use Allo Tablet

When you must not take it

Do not take Allo Tablet and **tell** your doctor if you:

- are **allergic** (hypersensitive) to allopurinol or any other ingredients of Allo Tablet (listed in Product description – Ingredients).
- are currently suffering from an acute **attack of gout**.

Before you start to take it

Check with your doctor or pharmacist **before** taking Allo tablets if you:

- have severe liver or kidney disease, you may be given a lower dose.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription. Especially:

- azathioprine (to treat rheumatoid arthritis and after organ transplants)
- ciclosporin (to treat psoriasis, rheumatoid arthritis or after organ transplants)
- 6-mercaptopurine (used to treat some cancers and bowel diseases)
- adenine arabinoside
- probenecid (used in gout)
- phenytoin (used in epilepsy)
- theophylline (to treat asthma)
- ampicillin or amoxicillin (antibiotics)
- aspirin or related medicines (salicylates)
- drugs to prevent blood from clotting (such as warfarin)
- chlorpropamide (used in diabetes)
- didanosine (antiviral)
- diuretics (water tablets) or ACE inhibitors such as captopril (used in high blood pressure)

4. How to take Allo Tablet

How much to take

Always take Allo Tablet exactly as your doctor has told you. If you are not sure, check with your doctor or pharmacist.

Doses:

Adults:

Starting dose of 100-300mg once a day, this may be increased to 200-600mg a day in divided doses.

A maximum dose of over 900mg a day is rarely needed.

Children (usually restricted to metabolic disease or cancer):

10-20mg per kg of body weight a day.

Elderly or patients with kidney disease:

Your doctor may prescribe a smaller dose.

When to take it

- You should swallow the Allo Tablet whole with water after meals, if possible.
- Try to take your dose at the same time(s) each day to avoid missing any doses.
- Drink plenty of fluids while you are on this medicine.
- Before starting treatment with allopurinol your doctor may give you an anti-inflammatory drug or colchicine, this helps prevent you getting acute gout attacks.

How long to take it

You should take Allo Tablet as long as your doctor prescribes it.

Do not stop the treatment without discussing it with your doctor first.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. If you forget to take a dose take it as soon as you remember it and then take the next dose at the right time.

If you take too much (overdose)

If you (or someone else) swallow a lot of the tablets at the same time, or if you think a child has swallowed any of the tablets, contact your nearest hospital casualty department or tell your doctor immediately.

5. While you are using Allo Tablet

Things you must do

You can take Allo Tablet with food.

Things you must not do

Pregnancy and breast-feeding:

If you are pregnant, planning to become pregnant or are breast-feeding ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines:

Allo tablets may make you feel dizzy, affect your co-ordination or make you sleepy. Make sure you are not affected before you drive or operate machinery.

Things to be careful of

Allo Tablet contains lactose. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

6. Side effects

Like all medicines, Allo Tablet can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking Allopurinol tablets and contact your doctor at once if you experience the following allergic reactions:

- itchy or flaky skin rash, bruising or discolouration of the skin
- fever, swollen lymph glands, joint pain, changes in blood composition, swollen blood vessels, inflammation of the liver (hepatitis), jaundice (yellowing of the skin or whites of the eyes), kidney damage (blood in the urine) or fits.

Tell your doctor if you notice any of the following side effects or notice any other effects not listed:

- Gastrointestinal: feeling or being sick, vomiting blood, offensive fatty diarrhoea, changes in bowel habits, swollen mouth and changes in taste
- Nervous system: headache, general tiredness, dizziness, depression, coma, nerve disorders including lack of muscle control, paralysis, weakness and numbness, "pins and needles", sleepiness

- **Heart:** chest pain (angina), slow heart beat, oedema (water retention), high blood pressure

• Other effects:

fever, worsening of acute gout attacks, cataract, diabetes, hair loss, changes in hair colour, boils, changes in blood chemistry and blood cells, disturbances of vision, enlarged breasts in men, difficulty maintaining an erection, "wet dreams", infertility, blood in the urine, high levels of fat or urea in the blood.

If you notice any side effects, they get worse, or if you notice any not listed, please tell your doctor or pharmacist.

7. After using Allo Tablet

Storage

Keep in a cool, dry place below 25°C, away from direct sun light.

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use Allo Tablet after the expiry date which is stated on the container after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not use Allo Tablet if you notice any visible sign of deterioration.

Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product description

What it looks like?

Allo 100 Tablet are white round tablet, in packing of 30's, 60's and 90's; 100's and 1000's (for export only).

Allo 300 Tablet are white round, shallow-convex & scored tablet, in packing of 30's; 60's, 100's, 500's and 1000's (for export only).

Ingredients

- The active substance (the ingredient that makes the tablets work) is Allopurinol. Each tablet contains either 100mg or 300mg of the active ingredient.

- The other ingredients are:

Lactose, Starch, Gelatin, Aerosil, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate.

Allo 100 Tablet - MAL19870282A

Allo 300 Tablet - MAL19870299A

Manufacturer, Holder and Distributed by

Biosis Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
1572, Jalan Besar Valdor,
Mukim 12, Sungai Bakap,
14200 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang, Malaysia.

Revision Date: September 2011

Tablet Allo 100

Tablet Allo 300

Allopurinol 100mg

Allopurinol 300mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Tablet Allo
2. Bagaimana Tablet Allo berfungsi
3. Sebelum mengambil Tablet Allo
4. Cara menggunakan Tablet Allo
5. Semasa menggunakan Tablet Allo
6. Kesan-kesan sampingan
7. Selepas menggunakan Tablet Allo

Sila baca risalah ini dengan teliti sebelum mengambil ubat ini.

- Sila simpan risalah ini untuk rujukan.
- Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.
- Ubat ini telah dipreskripsikan khas untuk kamu, jangan bagi orang lain mengambilnya. Tindakan itu mungkin membahayakan kesihatan mereka walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang seperti kamu.
- Sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan serius, atau sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila memberitahu doktor atau ahli farmasi anda.

1. Apakah kegunaan Tablet Allo

Allopurinol tablet digunakan dalam:

- rawatan penyakit gout dan lain-lain keadaan yang berkaitan dengan berlebihan asid urik dalam tubuh, seperti penyakit buah pinggang, gangguan metabolisme, penyakit kulit tertentu, kanser dan rawatan dengan diuretik ("tablet buang air").
- penyakit batu karang.

2. Bagaimana Tablet Allo berfungsi

Tablet Allo mengandungi bahan aktif allopurinol, yang bertindak dengan menghalang enzim yang menukar hipoxanthin kepada asid urik di dalam tubuh.

3. Sebelum mengambil Tablet Allo

Bila tidak boleh mengambil

- Sekiranya anda hipersensitif atau alah kepada allopurinol atau mana-mana bahan kandungan Tablet Allo

(yang tersenarai di bahagian "Maklumat lanjut - Bahan-bahan Kandungan"))

- Sekiranya anda sedang menderita daripada serangan akut gout.

Sebelum mula mengambil

Berhati-hati semasa mengambil Tablet Allo

Sila maklumkan kepada doktor anda sebelum anda mula makan ubat ini:

Sekiranya anda mempunyai penyakit buah pinggang atau hati yang tenat.

Doktor anda mungkin perlu kurangkan dos ubat anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang atau baru-baru ini menggunakan ubat-ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Terutamanya:

- azathioprine (untuk merawat rheumatoid arthritis dan selepas transplantasi organ)
- ciclosporin (untuk merawat psoriasis, rheumatoid arthritis atau selepas transplantasi organ)
- 6-mercaptopurine (digunakan untuk mengubati beberapa jenis kanser dan penyakit usus)
- adenine arabinoside
- probenecid (merawat gout)
- phenitoin (merawat epilepsi)
- theofilin (merawat asma)
- ampicilin atau amoksisilin (antibiotik)
- aspirin atau ubat yang berkaitan (salisilat)
- ubat untuk mencegah pembekuan darah (seperti warfarin)
- chlorpropamide (merawat kencing manis)
- didanosine (antivirus)
- diuretik (ubat buang air) or ACE inhibitors seperti captopril (merawat tekanan darah tinggi)

4. Cara menggunakan Tablet Allo

Berapa banyak harus diambil

Makan Tablet Allo ikut arahan doktor anda. Sila minta nasihat doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Dos:

Dewasa:

Dos mula biasanya 100-300mg sehari, ini boleh ditingkatkan kepada 200-600mg sehari, dalam dos terbahagi.

Dos maksima melebihi 900mg sehari adalah amat jarang diperlukan.

Kanak-kanak (biasanya terhad kepada yang mengidap penyakit kanser atau penyakit metabolik):

10-20mg untuk setiap kg berat badan sehari.

Pesakit buah pinggang dan orang tua:

Doktor anda mungkin menggunakan dos yang rendah.

Bila perlu ambil

- Anda harus menelan tablet Allo tanpa dikunyah dengan air selepas makan, jika boleh.
- Anda harus mengambil ubat pada masa yang sama setiap hari supaya tidak tertinggal dos.
- Minum banyak air semasa anda sedang menerima rawatan ubat ini.
- Sebelum rawatan dengan allopurinol bermula doktor anda mungkin memberi anda ubat anti-keradangan atau colchicine, ini membantu mengelakkan anda mendapat serangan akut gout.

Berapa lama perlu diambil

Anda perlu mengambil Tablet Allo jika doktor anda mempreskripsikannya. Jangan berhenti rawatan ini tanpa berbincang terlebih dahulu dengan doktor anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penggunaan ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda lupa mengambil Tablet Allo, makan ubat itu dengan serta merta. Kemudian makan ubat berikutnya mengikut waktu yang biasa.

Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda (atau orang lain) menelan banyak tablet pada masa yang sama, atau jika anda berfikir anak telah menelan salah satu tablet, hubungi

jabatan kecemasan terdekat atau memberitahu doktor anda.

5. Semasa menggunakan Tablet Allo

Perkara yang perlu dilakukan

Anda boleh mengambil Tablet Allo bersama makanan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Kehamilan dan menyusui

Pengambilan ubat ini semasa kehamilan tidak digalakkan.

Sekiranya anda sedang hamil atau merancang untuk hamil atau sedang menyusui, sila beritahu doktor anda sebelum rawatan ubat ini bermula.

Memandu dan Mengendalikan Mesin

Tablet Allo mungkin membuat anda rasa pening kepala, mengganggu koordinasi atau membuat anda mengantuk. Pastikan anda tidak terpengaruh sebelum anda memandu atau mengendalikan mesin.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Tablet Allo mengandungi laktosa. Sekiranya anda mempunyai intoleransi terhadap laktosa, sila hubungi doktor anda sebelum mula mengambil ubat ini.

6. Kesan-kesan sampingan

Tablet Allo mungkin menyebabkan kesan-kesan sampingan. Akan tetapi, bukan semua orang yang ambil ubat ini akan mengalami kesan sampingannya.

Berhenti mengambil allopurinol tablet dan hubungi doktor anda serta merta jika anda mengalami tindakbalas alahan seperti berikut:

- ruam kulit yang gatal atau mengelupas, lebam atau perubahan warna kulit
- demam, bengkak kelenjar limfa, sakit sendi, perubahan dalam komposisi darah, saluran darah bengkak, keradangan hati (hepatitis), sakit kuning (kulit atau putih mata menjadi kuning), kerosakan ginjal (darah dalam urin) atau kejadian tarik.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengalami salah satu daripada kesan-kesan sampingan atau kesan

sampingan lain yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini:

- Gastrointestinal: Rasa sakit atau sakit, muntah darah, cirit yang berlemak dan busuk, perubahan kebiasaan buang air besar, mulut bengkak dan gangguan rasa

- Sistem saraf: sakit kepala, keletihan umum, pening, depresi, koma, gangguan saraf termasuk kurangnya kawalan otot, kelumpuhan, kelemahan dan rasa kebas, rasa tercucuk jarum, mengantuk

- Jantung: sakit dada (angina), denyutan jantung lambat, edema (retensi air), tekanan darah tinggi

- Kesan lain: demam, serangan gout akut yang semakin teruk, katarak, diabetes, rambut gugur, perubahan warna rambut, bisul, perubahan kimia darah dan sel-sel darah, gangguan penglihatan, pembesaran payudara pada lelaki, kesulitan mempertahankan ereksi, "mimpi basah", mandul, darah dalam urin, kandungan lemak atau urea dalam darah yang tinggi.

Jika anda mengalami kesan sampingan, atau kesan sampingan menjadi lebih teruk, atau jika anda mendapati kesan sampingan yang tidak disenaraikan, sila maklumkan doktor atau ahli farmasi.

7. Selepas menggunakan Tablet Allo

Cara penyimpanan

Simpan di kawasan yang kering di bawah suhu 25°C dan jauhkan daripada cahaya matahari

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Jangan ambil Tablet Allo selepas tarikh luput yang tertera selepas perkataan "EXP" pada botol.

Jangan mengambil ubat ini sekiranya sebarang tanda-tanda rosak diperhatikan.

Cara pelupusan

Ubat ini tidak boleh dibuangkan secara sebarangan ke dalam sistem pembuangan. Sila tanya ahli farmasi anda terhadap cara pelupusan ubat yang tidak digunakan untuk melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet Allo 100 berwarna putih, bentuk bulat, dibekalkan dalam botol yang mengandungi 30's, 60's and 90's; 100's and 1000's (Ekspot sahaja).

Tablet Allo 300 berwarna putih, bentuk bulat, sedikit bercembung, bergaris tengah dan dibekalkan dalam botol yang mengandungi 30's, 60's and 90's; 100's and 1000's (Ekspot sahaja).

Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktifnya (bahan yang memberi kesan rawatannya) adalah Allopurinol. Setiap tablet mengandungi Allopurinol 100mg (Tablet Allo 100) atau 300mg (Tablet Allo 300).

-Lain-lain bahan kandungan:

Lactose, Starch, Gelatin, Aerosil, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate

Tablet Allo 100 - MAL19870282A

Tablet Allo 300 - MAL19870299A

Pengilang, Pemegang Pemasaran, dan Diedar oleh

Biosis Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
1572, Jalan Besar Valdor,
Mukim 12, Sungai Bakap,
14200 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Semakan: September 2011