

ALPRANAX Tablet

Alprazolam 0.5mg

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about ALPRANAX Tablet. It does not contain all the available information. Please refer to healthcare professionals for further information.

What ALPRANAX TABLET is used for
ALPRANAX Tablet is used to relief anxiety, anxiety accompanied by depression, panic attacks and sleeping disorder (insomnia).

How ALPRANAX TABLET works

Alprazolam belongs to a group of medicines called benzodiazepines which affect chemical activity in the brain to promote sleep and to reduce anxiety and worry.

Before you use ALPRANAX TABLET

When you must not take it

You must not take ALPRANAX Tablet if you are allergic towards alprazolam or other similar benzodiazepines medicines. Do not give this medicine to children without doctor's instruction.

Before you start to take it

Talk to your doctor or pharmacist if you:

- are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding.
- are having depression.
- have ever suffered any mental illness that requires hospital treatment.
- are allergic to any other medications.
- having any health related problems.

Taking other medicines

Some medicines may affect how well ALPRANAX Tablet works. These include:

- Antipsychotics (used for mental/emotional conditions)
- Sedatives (used to produce calmness or to help you sleep)
- Medicines for depression
- Pain reliever
- Medicines to control fits
- Anaesthetics
- Sedative antihistamines (used for cold and flu relief)
- Cimetidine (used to treat acid reflux and ulcers)
- Oral contraceptives
- HIV protease inhibitors (used in HIV infection)
- Antibiotics such as erythromycin

- Antifungals such as ketoconazole
- Besides that, you must also inform them about all the medicines you are taking, including those you have bought without a prescription.

How to take ALPRANAX Tablet

How much to take

The optimal dose of ALPRANAX Tablet will be different for each person. Please consult your doctor before using this medication.

When to take it

ALPRANAX Tablet should be taken according to the time advised by your doctor or pharmacist. It can be taken immediately after meals or on an empty stomach.

How long to take it

ALPRANAX Tablet should be used for short periods only (for example, 2- 4 weeks). Continuous long term use is not recommended unless advised by your doctor. The use of benzodiazepines may lead to dependence on the medicine.

If you forgot to take it

If you miss a dose of ALPRANAX Tablet and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is approaching time for the next dose, do not double the dose to make up for the forgotten dose, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else has taken too much ALPRANAX Tablet.

While you are using ALPRANAX Tablet

Things you must do

Follow your doctor's instruction when you are taking ALPRANAX Tablet.

Things you must not do

Do not take ALPRANAX Tablet for a longer time, stop taking this medicine or change the dosing regimen without

instruction from your doctor. Do not give ALPRANAX Tablet to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Be careful when drinking alcohol while taking ALPRANAX Tablet. Do not drive or operate machinery after consuming ALPRANAX Tablet because it may cause drowsiness or dizziness in some people and therefore may affect alertness.

Common Side effects

ALPRANAX Tablet may commonly cause drowsiness, dizziness, lightheadedness, blurred vision, coordination disorders, stomach discomfort and nervous system problems. Please tell your doctor or pharmacist if you experience any other side effects.

After using ALPRANAX Tablet

Storage

Store below 30°C. Protect from light and moisture.


Disposal

ALPRANAX Tablet should be disposed when your doctor or pharmacist tells you to stop taking this tablet or it has passed the expiry date. ALPRANAX Tablet should not be disposed via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose medicines that are no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product description

What it looks like

ALPRANAX Tablet is an elliptical light-pink colour tablet in the shape of



Active ingredients

Alprazolam, Magnesium Stearate, Povidone, Polyethylene Glycol, Sodium Starch Glycolate, Erythrosine Lake, Lactose.

MAL 06011717A

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Date of revision :

9th Sept 2012

ALPRANAX TABLET

Alprazolam 0.5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang ALPRANAX Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada pakar kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan ALPRANAX Tablet

ALPRANAX Tablet digunakan untuk melegakan keresahan, keresahan berhubungan dengan kemurungan, gangguan panik dan gangguan tidur (insomnia).

Bagaimana ALPRANAX Tablet berfungsi

ALPRANAX Tablet digolongkan dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai benzodiazepine. Ubat ini akan mempengaruhi aktiviti kimia di dalam otak untuk menggalakkan tidur dan mengurangkan keresahan dan kebimbangan.

Sebelum Mengambil ALPRANAX Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil ALPRANAX Tablet jika anda alah terhadap alprazolam atau benzodiazepine yang lain.

Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor anda jika anda:

- Hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak.
- Mengalami kemurungan.
- Pernah mengalami sebarang penyakit jiwa yang memerlukan rawatan di hospital.
- Alah terhadap sebarang ubat lain.
- Mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Sesetengah ubat-ubatan boleh menjejaskan fungsi ALPRANAX Tablet, termasuknya:

- Antipsychotic (untuk merawat penyakit jiwa/emosi)
- Sedatif (untuk memberi kesan ketenangan atau membantu anda tidur)
- Ubat untuk kemurungan
- Ubat penahan sakit
- Ubat untuk mengawal sawan
- Ubat pelali
- Antihistamin sedatif (untuk melegakan selesema)
- Cimetidine (untuk merawat refluks asid dan ulser)
- Pil perancang
- HIV protease inhibitor (digunakan dalam jangkitan HIV)
- Antibiotik seperti erythromycin

- Antifungus seperti ketoconazole

Selain itu, anda juga perlu memberitahu mereka tentang semua ubat yang anda sedang ambil, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan ALPRANAX Tablet

Berapa banyak harus diambil

Dos optimum ALPRANAX Tablet akan berbeza untuk setiap orang. Sila berjumpa dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini.

Bila perlu diambil

ALPRANAX Tablet perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Ubat ini boleh diambil segera selepas makan atau perut kosong.

Berapa lama perlu diambil

ALPRANAX Tablet harus digunakan untuk tempoh yang singkat (2-4 minggu) sahaja. Penggunaan untuk jangka panjang adalah tidak digalakkan kecuali dinasihati oleh doktor anda kerana ubat ini akan menyebabkan ketergantungan ubat.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos ALPRANAX Tablet dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Minta bantuan perubatan dengan segera jika anda atau orang lain mengambil terlebih dos.

Semasa menggunakan ALPRANAX Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ALPRANAX Tablet.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil ALPRANAX Tablet untuk jangka masa panjang, berhenti mengambil ubat ini atau mengubah rejim dos tanpa arahan daripada doktor. Jangan berikan ALPRANAX Tablet kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan pengambilan alkohol semasa rawatan dengan ALPRANAX Tablet. Jangan memandu kereta atau mengendalikan jentera yang berbahaya selepas mengambil ubat ini kerana ubat ini akan menyebabkan kesan mengantuk atau pening kepala pada sesetengah orang.

Kesan-kesan sampingan biasa

ALPRANAX Tablet biasanya boleh menyebabkan rasa mengantuk, pening kepala, penglihatan kabur, gangguan koordinasi, ketidakselesaan perut dan masalah sistem saraf. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang lain.

Selepas menggunakan ALPRANAX Tablet

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

Cara pelupusan

ALPRANAX Tablet perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

ALPRANAX adalah tablet merah jambu berbentuk ellips dengan rupa bentuk "YS 2" " "

Bahan kandungan

Alprazolam, Magnesium Stearate, Povidone, Polyethylene Glycol, Sodium Starch Glycolate, Erythrosine Lake, Lactose.

MAL no. 06011717A

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Marketing Authorization Holder:

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

5th Sept 2012