

Patient Information Leaflet (PIL)

Amlodepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

What is in this Leaflet

- This leaflet answers some common questions about Amlodipine Besilate Tablets.
- It does not contain all of the available information. It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.
- All medicines have benefits and risks. Your doctor has weighed the risks of you taking Amlodipine Besilate against the benefits they expect it will have for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

What Amlodipine Besilate tablets is used for

Amlodipine Tablets belongs to a group of medicines called calcium antagonists.

How Amlodipine Besilate tablets works

- High blood pressure (hypertension)
- Chest pain due to narrowing of the coronary arteries of the heart muscle (angina pectoris) or the more rare form of chest pain caused by cramping of the coronary arteries of the heart muscle (vasospastic angina)

If you suffer from high blood pressure, Amlodipine Tablets works by relaxing blood vessels, so that blood passes through them more easily.

If you suffer from angina pectoris, Amlodipine Tablets works by improving blood supply to the heart which then receives more oxygen and as a result chest pain is prevented. *Ask your doctor if you have any questions about why*

Amlodipine Besilate tablets has been prescribed for you.

This medicine is only available with a doctor's prescription.

Before you take Amlodipine Besilate tablets

****When you must not take it***

Do not take Amlodipine

Besilate tablets if:

- You have ever had an allergic reaction to Amlodipine Besilate tablets or other calcium channel blockers. These medicines include felodipine, nifedipine or lercanidipine. Check with your doctor or pharmacist if you are unsure. Some of the symptoms of an allergic reaction to Amlodipine Besilate tablets may include a skin rash similar to hives, itchiness, shortness of breath, swelling of the face, lips or tongue.
- You are allergic to any of the ingredients listed at the end of this leaflet.
- Amlodipine Besilate tablets are not recommended for use in children as there have been no studies of its effects in children.
- If you are not sure whether you should be taking Amlodipine Besilate tablets, talk to your doctor.

Do not take Amlodipine

Besilate tablets if:

- the packaging shows signs of tampering or does not look quite right.
- the expiry date marked on the packaging has passed, even though the tablets may look alright.
- If it has expired or is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

****Before you start to take it***

Tell your doctor if:

- You are pregnant or intend to become pregnant while taking Amlodipine Besilate tablets.

- Medicines like Amlodipine Besilate tablets may affect the developing baby if you take it during pregnancy. Your doctor will discuss the possible risks and benefits of taking Amlodipine Besilate tablets during pregnancy.
- You are breastfeeding or wish to breastfeed.
- Your doctor will discuss the risks and benefits of taking Amlodipine Besilate tablets when breastfeeding.
- You are allergic to any foods, dyes, preservatives or any other medicines. You have any health problems, including:
 - ✓ heart disease such as heart failure
 - ✓ liver problems
 - ✓ any other allergies

****Taking other medicines***

Tell your doctor if you are taking any other medicines, including medicines you buy without a prescription from a pharmacy, supermarket or health food shop. Some medicines and Amlodipine Besilate tablets may interfere with each other.

Your doctor or pharmacist has a complete list of medicines to be careful with or avoid while taking Amlodipine Besilate tablets.

If you have not told your doctor or pharmacist about these things, tell them before you start taking Amlodipine Besilate tablets.

How to take Amlodipine Besilate tablets

Take Amlodipine Besilate tablets exactly as your doctor has prescribed.

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist. They may differ from the information contained in this leaflet.

If you do not understand the instructions on the box ask

Patient Information Leaflet (PIL)

Amdepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

your doctor or pharmacist for help.

****How much to take***

The usual dose of Amlodipine Besilate tablets is one 5 mg tablet each day. Your doctor may increase this to one 10 mg tablet each day.

Your doctor may prescribe another dose of Amlodipine Besilate tablets depending on your condition and how you respond to this medicine.

****When to take it***

Swallow the tablet whole with a full glass of water. Take your tablet at about the same time each day, either morning or evening. Taking your tablet at the same time each day will have the best effect. It will also help you to remember when to take it. Amlodipine Besilate tablets can be taken with or without food.

****How long to take it***

You must take Amlodipine Besilate tablets every day. Continue taking your medicine for as long as your doctor tells you.

****If you forget to take it***

If you miss a dose and it is less than 12 hours from when you should take it, take it straight away, then continue as normal the next day. Otherwise, skip that day's dose but be sure to take the next day's dose when it is due.

Do not take a double dose to make up for the dose that you missed. This may increase the chance of getting an unwanted side effect.

****If you take too much (overdose)***

Immediately telephone your doctor or Poisons Information Centre or go to Accident and Emergency (Casualty) at your nearest hospital if you think

you or anyone else may have taken too much Amlodipine Besilate tablets. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. You may need urgent medical attention.

If you take too many tablets, you may feel dizzy, lightheaded or faint and have an irregular heart beat.

While you are using Amlodipine Besilate tablets

****Things you must do***

Tell any other doctors, dentists and pharmacists who are treating you that you are taking Amlodipine Besilate tablets.

If you are about to start any new medicine, tell your doctor or pharmacist that you are taking Amlodipine Besilate tablets.

If you become pregnant while taking Amlodipine Besilate tablets tell your doctor immediately.

****Things you must not do***

Do not take Amlodipine Besilate tablets to treat any other conditions unless your doctor says to.

Do not give this medicine to anyone else, even if they have the same condition as you.

****Things to be careful of***

Be careful driving or operating machinery until you know how Amlodipine Besilate tablets affects you.

Amlodipine Besilate tablets may cause dizziness or drowsiness in some people and affect alertness.

If this occurs, do not drive, operate machinery or do things that could be dangerous if you are not alert.

Side Effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking Amlodipine Besilate tablets.

Amlodipine Besilate tablets helps most people but it may have some unwanted side effects in a few people. All medicines can have side effects. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical treatment if you get some of the side effects.

Do not be alarmed by the list of possible side effects. You may not experience any of them.

Tell your doctor if you experience any of the following and they worry you:

- swelling of the ankles, feet, face or hands
- headache
- dizziness
- flushing
- palpitations
- tiredness
- drowsiness or sleepiness
- stomach pain or nausea
- indigestion
- unusual tiredness or weakness

These are the more common side effects of Amlodipine Besilate tablets.

Tell your doctor if you experience any of the following:

- muscle cramps or aches
- sexual problems
- swollen gums
- constipation
- weight gain
- sleeplessness
- feeling nervous, depressed or moody
- changes in vision or sight
- loss or thinning of hair
- ringing in the ears

These may or may not be due to Amlodipine Besilate tablets but you should tell your doctor if they worry you.

Tell your doctor immediately if you notice any of the following:

- changes in heart beat either fast or slow
- chest pain

Patient Information Leaflet (PIL)

Amdepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

- dizziness or lightheadedness on standing up from a sitting or lying position
- shortness of breath
- symptoms of allergy such as skin rash and/or itching
- symptoms of liver disease such as itching, yellowing of the skin and eyes, and dark coloured urine

These may be serious side effects that may need urgent medical attention. Serious side effects are rare. This is not a complete list of all possible side effects. Others may occur in some people and there may be some side effects not yet known.

If you notice any other symptoms that worry you, check with your doctor. Ask your doctor or pharmacist if you don't understand anything in this list. If you are 65 years or older, you should be especially careful while taking Amlodipine Besilate tablets. Report any side effects promptly to your doctor. Some people in this age group may be more likely to experience side effects such as swelling of the feet and ankles, muscle cramps and dizziness.

Storage and Disposal of Amlodipine Besilate tablets

****Storage***

Keep your tablets in the pack until it is time to take them. If you take your tablets out of the pack they will not keep as well. Keep your tablets in a cool dry place where temperatures stay below 30°C.

Do not store Amlodipine Besilate tablets or any other medicine in the bathroom or near a sink.

Do not leave your medicines on a window sill or in the car. Heat and dampness can destroy some medicines.

Keep Amlodipine Besilate tablets where children cannot reach it.

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

****Disposal***

If your doctor tells you to stop taking Amlodipine Besilate tablets, or the tablets have passed their expiry date, ask your pharmacist what to do with any left over.

Product Description

****What it look like***

Amdepin Tablets 5mg: White to off white, octagonal shaped, uncoated tablets, debossed with "AM 5" on one side and plain on other side.

Amdepin Tablets 10mg: White to off white, octagonal shaped, uncoated tablets, debossed with "AM 10" on one side and plain on other side.

Ingredients: Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Colloidal Silica Anhydrous, Sodium Starch Glycolate

MAL No :

Amdepin Tablets 5mg:
MAL11090016A

Amdepin Tablets 10mg:
MAL11090017A

MANUFACTURER



Cadila Pharmaceuticals Limited,
1389, Dholka – 387 810,
District: Ahmedabad,
Gujarat State, India.

Date of Revision

September 2011

Risalah Maklumat Ubat Pengguna (RiMUP)

Amdepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

- Risalah ini memberikan jawapan bagi beberapa soalan yang biasa ditanya mengenai Amlodipine Besilate Tablet.
- Ia tidak mengandungi semua maklumat yang sedia ada. Ia bukan untuk menggantikan perkataan/perbincangan daripada doktor atau ahli farmasi anda.
- Semua ubat mempunyai faedah dan risiko. Doktor anda akan menimbang risiko anda untuk mengambil Amlodipine Besilate terhadap faedah yang diinginkan untuk anda.
- Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membaca lagi.
- Ubat ini telah ditetapkan untuk anda dan jangan berkongsi dengan orang lain. Ia mungkin menjejaskan mereka, walaupun tanda-tanda mereka adalah sama seperti anda.

Apakah kegunaan Amlodipine Besilate Tablet

Amlodipine Tablet tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai 'calcium antagonists'.

Bagaimana Amlodipine Besilate Tablet berfungsi

- Tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Sakit dada akibat pengecilan arteri koronari otot jantung (angina pectoris) atau sakit dada (jarang berlaku) yang diakibatkan oleh kekejangan arteri koronari otot jantung (angina vasospastic).

Jika anda mengalami tekanan darah tinggi, Amlodipine Besilate Tablet bekerja dengan melonggarkan saluran darah dan jadi aliran darah dengan lebih mudah.

Jika anda mengalami angina pectoris, Amlodipine Besilate Tablet bekerja dengan meningkatkan bekalan darah ke jantung yang menghantarkan lebih banyak oksigen akan mencegah perlakuan sakit dada.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengapa Amlodipine Besilate tablet telah ditetapkan untuk anda. Ubat ini hanya disediakan dengan preskripsi doktor.

Sebelum mengambil Amlodipine Besilate Tablet

****Bila tidak boleh mengambil***

Jangan mengambil Besilate Amlodipine jika:

- Anda pernah mempunyai reaksi alahan terhadap Amlodipine Besilate tablet atau 'calcium channel blocker' yang lain termasuk felodipine, nifedipine atau lercanidipine. Tanya dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. Beberapa gejala reaksi alahan kepada Amlodipine Besilate tablet mungkin merangkumi ruam kulit yang sama dengan gatal-gatal, rasa gatal, sesak nafas, bengkak muka, bibir atau lidah.
- Anda alah kepada salah satu bahan-bahan kanduag yang disenaraikan pada hujung risalah ini.
- Amlodipine Besilate Tablet tidak disyorkan digunakan di kalangan kanak-kanak kerana tidak menjalani kajian mengenai kesannya di kalangan kanak-kanak.
- Berbincang dengan doktor anda, jika anda tidak pasti samada anda perlu mengambil Amlodipine Besilate Tablet.

Jangan mengambil Amlodipine Besilate tablets jika:

- Bungkus terkoyak atau menunjukkan tanda-tanda diusik macam kelihatan tidak betul.
- Tarikh luput yang ditanda pada bungkus telah tamat tempoh, walaupun ubat kelihatan baik.
- Jika ubat telah tamat tempoh atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk pelupusan.

**** Sebelum mula mengambil Beritahu doktor anda jika:***

- Anda mengandungi atau bercadang untuk hamil ketika mengambil Amlodipine Besilate tablets.
- Ubat-ubat seperti Amlodipine Besilate tablets akan menjejaskan perkembangan bayi jika anda mengambilnya semasa kehamilan. Doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah pengambilan Amlodipine Besilate semasa kehamilan.
- Ibu yang sedang menyusukan atau ingin penyusuan badan.
- Doktor anda akan membincangkan risiko dan manfaat daripada mengambil Amlodipine Besilate apabila penyusuan badan.
- Anda alah kepada sebarang makanan, pewarna, pengawet atau ubat-ubat lain.
- Anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, termasuk:
 - ✓ Penyakit jantung seperti kegagalan jantung
 - ✓ Penyakit hati
 - ✓ Sebarang alahan lain

**** Jika mengambil ubat-ubat lain***

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubat lain, termasuk ubat-ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat dan Amlodipine Besilate tablet

Amdepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

mungkin akan saling mengganggu.
Doktor atau ahli farmasi mempunyai senarai lengkap perubatan untuk berhati-hati atau mengelakkan semasa mengambil Amlodipine Besilate Tablet.
Jika anda tidak pernah memberitahu doktor atau ahli farmasi tentang perkara-perkara ini, beritahu kepada mereka sebelum anda mula mengambil Amlodipine Besilate.

Cara menggunakan Amlodipine Besilate Tablet

Ambil Amlodipine Besilate tablet seperti yang doktor anda telah tetapkan.
Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda.
Arahan yang tunjukan mungkin berbeza dari maklumat yang terdapat dalam risalah ini.
Jika anda tidak memahami arahan yang dicetak pada kotak, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

**** Berapa banyak harus digambil***

Dos biasa bagi Amlodipine Besilate tablet adalah 5mg tablet setiap hari. Doktor anda boleh meningkatkan dos ini kepada 10 mg tablet setiap hari.
Doktor anda boleh menetapkan dos Amlodipine Besilate tablet yang berlainan bergantung kepada keadaan anda dan bagaimana anda bertindak balas kepada ubat ini.

**** Bila perlu diambil***

Menelan seluruh tablet dengan segelas air.
Ambil tablet anda pada masa yang sama setiap hari, sama ada pagi atau petang.
Pengambilan tablet pada masa yang sama setiap hari akan mendapat kesan yang paling

baik. Ia juga akan membantu anda senang mengingati bila perlu diambil. Amlodipine Besilate Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

**** Berapa lama perlu diambil***

Anda mesti mengambil Amlodipine Besilate Tablet setiap hari. Teruskan mengambil ubat anda selama sebagai doktor anda memberitahu anda.

**** Jika terlupa mengambil***

Jika anda tertinggal satu dos dalam jangka masa tidak kurang daripada 12 jam dari masa sepatutnya anda perlu digambil, teruskan pengambilan ubat segera, lepas ini anda harus terus pada hari berikutnya seperti biasa. Jika tidak, abaikan dos yang tertinggal tetapi pastikan anda mengambil dos pada hari berikutnya.
Jangan mengambil dos berganda untuk membuat dos yang anda terlepas. Ini mungkin akan meningkatkan peluang untuk mengalami kesan sampingan yang tidak diingini.

**** Jika mengambil berlebihan (dos terlebih)***

Jika anda rasa anda atau sesiapa sahaja mengambil Amlodipine Besilate tablet yang berlebihan, telefon doktor atau Pusat Maklumat Racun atau pergi ke Unit Kecemasan di hospital yang terdekat dengan serta-merta. Anda harus mengambil tindakan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Dinasihatkan bahawa dos berlebihan memerlukan rawatan perubatan dengan segera.
Jika anda mengambil dos terlebih, anda mungkin berasa pening, pening-pening lalat atau pengsan dan mempunyai degupan jantung yang tidak teratur.

Semasa menggunakan Amlodipine Besilate Tablet

**** Perkara yang perlu dilakukan***

Beritahu mana-mana doctor lain, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Amlodipine Besilate tablet.
Jika anda ingin memulakan rawatan lain dengan perubatan baru, beritahu doktor atau ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Amlodipine Besilate tablet.
Jika anda sedang hamil ketika anda mengambil Amlodipine Besilate tablet beritahu doktor anda dengan segera.

**** Perkara yang tidak boleh dilakukan***

Jangan mengambil Amlodipine Besilate tablet untuk mana-mana keadaan sakit selainnya anda mendapat arahan dari doctor anda.
Jangan memberikan ubat ini kepada pesakit lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

**** Perkara yang perlu diberi perhatian***

Berhati-hati ketika memandu atau beroperasi mesin sehingga anda tidak mempunyai sebarang kesan sampingan semasa mengambil Amlodipine Besilate tablet. Amlodipine Besilate Tablet mungkin menyebabkan sesetengah orang berasa pening atau mengantuk yang akan menjejaskan kecerdasan. Jika ini berlaku, jangan memandu atau beroperasi mesin atau melakukan perkara-perkara yang mungkin berbahaya jika anda tidak memberhatikan.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Amlodipine Besilate tablet.

Risalah Maklumat Ubat Pengguna (RiMUP)

Amlodipin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

Amlodipine Besilate Tablet telah membantu banyak pesakit tetapi sesetengah pesakit mungkin mempunyai kesan-kesan sampingan yang tidak diingini. Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Kadang-kala kesan sampingan adalah teruk, tetapi kebanyakan kesan adalah tidak teruk. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan. Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan. Anda mungkin tidak akan mengalami sebarang daripada mereka.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang kesan-kesan sampingan yang berikut yang merisaukan anda:

- bengkak buku lali, kaki, muka atau tangan
 - sakit kepala
 - pening
 - kemerahan kulit
 - dengupan jantung yang tak normal
 - keletihan
 - rasa mengantuk atau mengantuk
 - sakit perut atau mual
 - senak (ketidakselesaan atau kesakitan pada abdomen selepas makan)
 - keletihan luar biasa atau rasa lemah
- Ini adalah kesan sampingan umum diperolehi oleh Amlodipine Besilate tablet.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang tanda yang berikut:

- kekejangan otot atau sakit
- masalah seksual
- gusi bengkak
- sembelit (Kekurangan buang air besar)
- berat badan bertambah
- tidak dapat tidur
- berasa gelisah, tertekan atau murung
- perubahan di dalam penglihatan atau pandangan

- keguguran atau penipisan rambut
 - dengungan dalam telinga
- Kesan-kesan tersebut tidak semestinya disebabkan oleh Amlodipine Besilate tablet tetapi anda perlu memberitahu doktor anda jika tanda-tanda ini merisaukan anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati sebarang tanda yang berikut:

- perubahan dengupan jantung yang menjadikan lebih cepat atau lebih lambat
- sakit dada
- bersasa pusing atau pening apabila berdiri dari posisi duduk atau berbaring
- sesak nafas
- gejala alahan seperti ruam kulit dan / atau gatal-gatal
- gejala penyakit hati seperti gatal, kekuningan pada kulit dan mata, dan air kencing berwarna gelap.

Ini mungkin merupakan kesan-kesan sampingan yang teruk yang memerlukan perhatian samaada menjalani rawatan perubatan dengan segera. Kesan sampingan yang teruk jarang berlaku. Ini bukan senarai lengkap bagi semua kesan sampingan yang akan dialami. Mungkin ada kesan sampingan yang lain berlaku pada sesetengah orang dan juga mungkin ada beberapa kesan sampingan yang tidak dikenali.

Jika anda mendapati sebarang gejala lain yang membimbangkan anda, pastikan dengan doktor anda. Tanya doktor anda atau ahli farmasi jika anda tidak memahami maklumat yang tercetak dalam senarai ini. Jika anda berumur 65 tahun dan keatas, anda harus lebih berhati-hati semasa mengambil Amlodipine Besilate tablet dan harus memberitahu doktor anda dengan segera jika mengalami sebarang kesan

sampingan. Didapati sesetengah pesakit yang berumur 65 tahun dan keatas adalah lebih berkemungkinan untuk mengalami kesan sampingan seperti bengkak kaki dan buku lali, kekejangan otot dan pening.

Cara penyimpanan dan pelupusan Amlodipine Besilate Tablet

*** Penyimpanan**

Pastikan ubat-ubat dalam bungkusan asal sehingga sampai waktu pengambilan ubat. Jika anda mengeluarkan ubat-ubat dari bungkusan asal, ubat ini mungkin tidak dapat mengekalkan keadaan penyimpanan yang baik. Simpan ubat-ubat di tempat yang sejuk dan kering dan pastikan suhu bilik adalah di bawah 30°C.

Jangan simpan Amlodipine Besilate tablet atau ubat-ubat lain di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ubat-ubat anda di tepi tingkap atau di dalam kereta. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat. Simpan Amlodipine Besilate tablet di tempat kanak-kanak tidak dapat mencapai/mengambil. Tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat ialah almari yang terkunci. Tempat ini perlu sekurang-kurangnya satu setengah meter dari lantai.

*** Pelupusan**

Jika doktor anda memberitahu anda untuk berhenti Amlodipine Besilate tablet, atau didapati ubat-ubat yang sudah tamat tempoh, anda harus tanya ahli farmasi tindakan yang perlu diambil bagi ubat-ubat yang masih ada.

Risalah Maklumat Ubat Pengguna (RiMUP)

Amdepin Tablet 5mg / 10mg

Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 5mg /Amlodipine Besylate equivalent to Amlodipine 10mg

Maklumat lanjut

**** Rupa dan warna produk***

Amdepin tablet 5mg:

Berwarna putih atau putih pudar, berbentuk oktagon, 'uncoated tablet', bercetak timbul dengan 'AM 5' di salah satu sampingan dan kosong di sampingan lain.

Amdepin tablet 10mg:

Berwarna putih atau putih pudar, berbentuk oktagon, 'uncoated tablet', bercetak timbul dengan 'AM 10' di salah satu sampingan dan kosong di sampingan lain.

Bahan-bahan kandungan:

Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Colloidal Silica Anhydrous, Sodium Starch Glycolate.

Nombor MAL

Amdepin Tablet 5mg:
MAL11090016A

Amdepin Tablet 10mg :
MAL11090017A

PENGILANG



Cadila Pharmaceuticals
Limited,
1389, Dholka – 387 810,
District: Ahmedabad,
Gujarat State, India.

Tarikh Kemaskini RiMUP

September 2011